

## Anziehhilfe mediven® Butler Stabile Anziehhilfe für Patienten mit eingeschränkter Greiffunktion

### INDIKATION

Krankheitsbilder oder Behinderungen mit erheblichen Funktionsstörungen der Finger-, Hand- und Armgelenke u. a. der Greiffunktion, z. B.

- Hochgradig entzündliche oder erheblich verschleißende Gelenkerkrankungen
- Lähmungsbilder
- Deformierende Erkrankungen im Handbereich
- Verletzungsfolgen und Amputationen
- Fehlbildungen
- Weitgehende Wirbelsäulen-, Hüft- und/oder Kniegelenksversteifung
- Adipositas per magna



Reha Butler



Lang-Griff Butler

Verordnungsfähig / HIMI: 02.40.01.3000

| Indikation   | Diagnose  | Länge                       | Länge |    |    | Ödemneigung |         |
|--|---|-----------------------------|-------|----|----|-------------|---------|
|  |   |                             | AD    | AG | AT |             |         |
| <br>chronisch venöse Insuffizienz<br>Stadium I   |   | je nach Aszension des Ödems |       |    |    | leicht      | CCL I   |
|  |   |                             |       |    |    | mittel      | CCL II  |
|  |   |                             |       |    |    | schwer      | CCL II  |
| <br>chronisch venöse Insuffizienz<br>Stadium II | Atrophie Blanche<br>Dermatosklerose                 | je nach Aszension des Ödems |       |    |    | leicht      | CCL II  |
|  |   |                             |       |    |    | mittel      | CCL II  |
|  |   |                             |       |    |    | schwer      | CCL II  |
| <br>entzündliche Venenerkrankungen             | oberflächliche Thrombophlebitis,<br>Varikophlebitis | Wade / distal               |       |    |    | leicht      | CCL II  |
|  |   | Oberschenkel / distal       | AD    | AG | AT | mittel      | CCL II  |
|  |   | Oberschenkel / proximall    |       |    |    | schwer      | CCL II  |
| <br>Varikosis                                  | primäre und sekundäre                               | Wade / distal               |       |    |    | leicht      | CCL II  |
|  |   | Oberschenkel / distal       | AD    | AG | AT | mittel      | CCL II  |
|  |   | Oberschenkel / proximall    |       |    |    | schwer      | CCL III |
| <br>thrombotische Ereignisse                   | tiefe Venenthrombose<br>postthrombotisches Syndrom  | Wade / distal               |       |    |    | leicht      | CCL II  |
|  |   | Oberschenkel / distal       | AD    | AG | AT | mittel      | CCL III |
|  |   | Oberschenkel / proximall    |       |    |    | schwer      | CCL III |